

Servizi vaccinali degli ambiti sanitari

Ambito Centro Nord

Trento

Centro per i servizi sanitari
Palazzina D Viale Verona
Tel. 0461 902247

Ambito Est

Pergine Valsugana

Via S. Pietro, 2
Tel. 0461 515200

Borgo Valsugana

Viale Vicenza, 9
Tel. 0461 755611

Tonadico

Via Roma, 1
Tel. 0439 764424 /
0439 764428

Cavalese

Via Dossi, 17
Tel. 0462 242183

Pozza di Fassa

Strada di Prè de Gejia, 4
Tel. 0462 242183

Ambito Ovest

Cles

Via Degasperi, 41
Tel. 0463 660308

Malè

Via IV Novembre, 8
Tel. 0463 909430

Mezzolombardo

Via degli Alpini, 7
c/o Poliambulatori
Tel. 0461 611293

Cembra

Via Marconi, 7
Tel. 0461 683711

Ambito Centro Sud

Rovereto

Piazza Leoni, 11/A
Tel. 0464 403704

Arco

Largo A.A. D'Asburgo, 1
Tel. 0464 582588

Tione di Trento

Via Presanella, 16
Tel. 0465 331428

Azienda provinciale per i servizi sanitari
Via Degasperi 79, 38123 Trento

Testi a cura dell'u.o. Igiene e sanità Pubblica

©Copyright 2018

Tutti i diritti riservati, riproduzione consentita con citazione obbligatoria della fonte

Collana "Promozione della salute"

Impaginazione: OnLine Group - Roma
Cordinamento editoriale: Ufficio Comunicazione
Finito di stampare nel mese di settembre 2018

www.apss.tn.it



L'infezione pneumococcica: perché vaccinarsi

Campagna di vaccinazione antipneumococcica



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

Cos'è l'infezione pneumococcica

L'infezione pneumococcica è dovuta allo pneumococco, germe responsabile di malattie gravi come: polmoniti, meningiti e infezioni del sangue (batteriemie). Tutti possono essere colpiti da queste malattie, soprattutto gli anziani e i soggetti che soffrono di malattie croniche, in particolare quelle renali, broncopolmonari, cardiache, il diabete e l'asplenia (senza milza).

Il vaccino è efficace?

L'infezione pneumococcica può essere facilmente prevenuta con la vaccinazione. Il vaccino stimola la produzione di anticorpi, riducendo in tal modo la probabilità di ammalarsi.

Se associato alla vaccinazione antinfluenzale riduce del 30-40% il numero di casi di polmonite nell'anziano durante il periodo influenzale.

La vaccinazione consiste nell'iniezione intramuscolare di una singola dose di vaccino e può essere eseguita contemporaneamente a quella antinfluenzale.

Per le persone che si vaccinano all'età di 65 anni e oltre è prevista una dose di rinforzo con vaccino PPV23 a distanza di 6-12 mesi.



Il vaccino è sicuro?

La gran parte delle persone non presenta alcun problema dopo la vaccinazione. Le reazioni al vaccino sono piuttosto rare e, di solito, di lieve entità. Gli effetti collaterali più frequentemente osservati sono di tipo locale e consistono in gonfiore e lieve dolenzia nel punto dell'iniezione. La comparsa della febbre è rara (in meno del 5% dei casi) come pure quella di altre reazioni generali (malessere generale, dolori muscolari); questi effetti collaterali insorgono nei giorni immediatamente successivi a quello della vaccinazione, sono di breve durata (24-48 ore) e si risolvono spontaneamente.

La vaccinazione deve essere rinviata nei soggetti con malattie acute febbrili in atto. Reazioni di ipersensibilità gravi, se pur possibili come per ogni farmaco, sono molto rare.

A chi viene offerta la vaccinazione?

In occasione della campagna annuale della vaccinazione antinfluenzale l'Azienda provinciale per i servizi sanitari invita con una lettera personalizzata tutte le persone di 65 anni a effettuare anche la vaccinazione antipneumococcica. Le persone di 66 anni vaccinate in precedenza verranno invitate a effettuare una dose di rinforzo con PPV23.

Possono effettuare gratuitamente la vaccinazione antipneumococcica anche le persone con più di 65 anni non vaccinate in precedenza e le persone di qualsiasi età affette da patologie croniche.