

*Servizio ospedaliero provinciale*

*Direzione*

Via Degasperi, 79 – 38123 Trento  
tel. 0461/903145 – fax 0461/904127  
Direttore: Fernando Ianeselli  
Segreteria: Serena Zanella  
ID.N. 33249166

Trento, 26/09/12

**Ai Medici del  
Servizio Ospedaliero Provinciale**

Caro collega,

gli antibiotici rappresentano un'arma terapeutica fondamentale della medicina moderna, essi hanno contribuito all'abbattimento dei tassi di mortalità e morbilità di molte malattie infettive e migliorato l'esito di trattamenti chirurgici che in epoca pre-antibiotica erano gravati da alti tassi di mortalità per le complicanze infettive post-intervento. Nel corso degli ultimi decenni si è purtroppo diffuso il fenomeno della resistenza dei microrganismi a molti antibiotici e questo ha reso problematico il trattamento di molte infezioni, massimamente di quelle infezioni che si manifestano in ambito ospedaliero. Il fenomeno della resistenza agli antibiotici è globale e rappresenta una vera emergenza medica e sociale.

A fronte dei dati ricavati dal sistema di sorveglianza continua delle resistenze operativo all'interno delle strutture dell'APSS, il Comitato per la prevenzione delle infezioni ospedaliere (CIO) dell'Ospedale S. Chiara di Trento ha scelto di affidare a un gruppo di lavoro multidisciplinare l'elaborazione di uno strumento informativo che potesse facilitare un più corretto uso clinico degli antibiotici nei pazienti ricoverati in attesa dei risultati dell'antibiogramma.

Il risultato del lavoro di questo gruppo è il piccolo manuale tascabile che vi presento: nella sua parte generale esso contiene informazioni sull'epidemiologia delle resistenze dei microrganismi e sull'uso degli antibiotici nell'APSS.

La seconda parte raccoglie, sotto forma di semplici schede, i suggerimenti per il trattamento delle principali infezioni tratti dalla letteratura più recente adattata alle resistenze rilevate nel nostro contesto operativo.

Nella speranza che questo semplice strumento di lavoro possa esservi utile nell'attività quotidiana vi invio i miei più sentiti auguri di buon lavoro.

Il Direttore  
del Servizio Ospedaliero Provinciale  
– dr. Fernando Ianeselli –

**Errata corrige:** A pagina 40 nella Fascite necrotizzante e nella Gangrena di Fournier la dose corretta di daptomicina è di 4-6 mg/kg/24h e non 46 mg/kg/24h.