



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1173

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Aggiornamento del calendario vaccinale contenuto nel piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento - accorpamento della vaccinazione Men B con le altre vaccinazioni previste per l'età pediatrica ed estensione della gratuità della vaccinazione anti-HPV a favore dei soggetti fragili

Il giorno **08 Agosto 2025** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**FRANCESCA GEROSA**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

il calendario delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto, è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012 e successivamente aggiornato da ultimo con deliberazione n. 1483 di data 20 settembre 2024. Il calendario è finalizzato a mantenere e sviluppare le attività di controllo delle malattie infettive prevenibili mediante le vaccinazioni, a garantire alla popolazione l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni considerate prioritarie nonché a raggiungere e mantenere le coperture vaccinali raccomandate dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025 (di seguito 'PNPV 23-25') e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Considerato l'andamento della copertura vaccinale relativa al vaccino per il Meningococco B (di seguito 'Men B') nell'età pediatrica e al fine di migliorarne le percentuali di adesione, anche alla luce dei casi riscontrati nel corso dell'anno precedente, si è ritenuto opportuno convocare la Commissione provinciale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive (di seguito 'Commissione provinciale') per esaminare le possibili azioni.

Nella riunione di data 15 luglio 2025 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito 'APSS') ha presentato i dati delle coperture vaccinali pediatriche dai quali emerge che il ciclo completo delle vaccinazioni meningococciche non raggiunge l'obiettivo di copertura del 90% stabilito dal PNPV 23-25.

In base al vigente calendario vaccinale dell'infanzia e dell'adolescenza, le prime 2 dosi del vaccino contro il Men B sono somministrate nel primo anno di vita a distanza di almeno 15 giorni dal vaccino esavalente e la terza dose al 15° mese di vita. Dai dati emerge che l'adesione alla vaccinazione esavalente è di 10 punti percentuali superiore rispetto a quella meningococcica, suggerendo che l'eventuale co-somministrazione con gli altri vaccini porterebbe a un aumento delle coperture per la vaccinazione meningococcica.

Recenti studi, presentati dall'APSS alla Commissione provinciale, evidenziano come la co-somministrazione dei vaccini per i quali una persona è idonea al momento della medesima favorisce il completamento del ciclo vaccinale entro l'età raccomandata dal PNPV 23-25, salvo specifiche controindicazioni evidenziate dal medico curante. La co-somministrazione permetterebbe altresì di ottimizzare la gestione delle sedute vaccinali e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Vaccinale Nazionale.

Alla luce di tali dati e viste le esperienze di altre regioni che hanno adottato la co-somministrazione della vaccinazione Men B insieme alle altre vaccinazioni previste per l'età pediatrica, tra cui Calabria, Liguria, Marche, Sicilia e Veneto, nonché tenuto conto della sicurezza per gli utenti, l'APSS propone alla Commissione provinciale di modificare il calendario vaccinale, come riportato nell'allegato parte integrante alla presente deliberazione, accorpendo la somministrazione delle dosi del vaccino per il Men B con:

- le vaccinazioni esavalente, rotavirus e pneumococco per il primo anno di vita,
- la vaccinazione MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella), Meningococco ACWY per il secondo anno di vita.

Considerati i dati e gli studi presentati, la Commissione provinciale si esprime in senso favorevole.

Con riferimento alla vaccinazione per il Men B nell'età dell'adolescenza, al fine di incrementare la relativa copertura, l'APSS propone alla Commissione provinciale di avviare la chiamata attiva per tale vaccinazione al 15° anno di età a partire dalla coorte dei nati nel 2009, purché gli stessi non siano stati già vaccinati nei 5 anni precedenti. La Commissione provinciale esprime parere

favorevole a tale proposta.

Con riferimento alla vaccinazione contro il papilloma virus umano (di seguito 'HPV'), al fine di promuoverne l'adesione da parte dei soggetti a rischio per condizioni patologiche, c.d. soggetti fragili, secondo la definizione contenuta nel PNPV 23-25, l'APSS propone alla Commissione provinciale, che si esprime in senso favorevole, di prevedere la gratuità della vaccinazione per tali categorie di persone.

Preso atto dei pareri espressi dalla Commissione provinciale, con la presente deliberazione si propone di aggiornare il calendario provinciale delle vaccinazioni, come da allegato parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, i cui oneri trovano copertura nelle risorse di parte corrente ripartite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2237 di data 23 dicembre 2024 "Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2025-2027 e assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente anno 2025" successivamente integrata con provvedimento n. 438 di data 28 marzo 2025.

Tutto ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentito il relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aggiornamento del calendario vaccinale contenuto nel piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la Provincia autonoma di Trento, come riportato nell'allegato parte integrante alla presente deliberazione, mediante:
  - a) accorpamento della somministrazione della prima e seconda dose del vaccino per il Men B insieme ai vaccini esavalente, rotavirus e pneumococco, e della terza dose insieme ai vaccini MPRV (morbillo, parotite, rosolia, varicella) e Meningococco ACWY;
  - b) avviare la chiamata attiva per la vaccinazione Men B al 15esimo anno di età a partire dalla coorte dei nati nel 2009;
  - c) estensione della gratuità della vaccinazione anti HPV a favore dei soggetti a rischio per condizioni patologiche, secondo la definizione contenuta nel PNPV 23-25;
2. di dare atto che il calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012, così come modificato da ultimo con deliberazione n. 1483 di data 20 settembre 2024, è integrato e modificato come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dall'aggiornamento del calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'adulto di cui al punto 1) sono ricompresi nelle risorse di parte corrente, ripartite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2237 di data 23 dicembre 2024 successivamente integrata con deliberazione n. 438 di data 28 marzo 2025 concernente disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del

Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2025-2027;

4. di dare atto che l'imputazione della spesa di cui al punto 3 è coerente con l'esigibilità della stessa;
5. dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP "Codice Unico di Progetto" in applicazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n.3, come modificato con il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli adempimenti di competenza.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## Calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza

VACCINO	ETA'										
	0-30 giorni	3° mese	4° mese	5° mese	6°-7° mese	11° mese	13° mese	15° mese	6° anno	12° anno	15° anno
<b>DTPa</b>		DTPa		DTPa		DTPa			DTPa <sup>(1)</sup>		dTpa <sup>(2)</sup>
<b>IPV (Polio)</b>		IPV		IPV		IPV			IPV		IPV
<b>EpB</b> (Epatite B)	EpB-1,2 <sup>(3)</sup>	EpB		EpB		EpB					
<b>Hib</b> (Emofilo)		Hib		Hib		Hib					
<b>PCV-15</b> (Pneumococco)		PCV-15		PCV-15		PCV-15					
<b>Men B</b> (Meningococco B)		MenB-1		MenB-2			MenB-3				Men-B <sup>(4)</sup>
<b>MPRV</b>							MPRV-1 <sup>(5)</sup> oppure MPR +Var		MPRV		
<b>Men ACWY</b> (Meningococco ACWY)							Men ACWY				Men ACWY <sup>(6)</sup>
<b>HPV</b>										HPV-1,2 <sup>(7)</sup>	HPV <sup>(8)</sup>
<b>Rotavirus</b>		Ciclo a 2 o a 3 dosi <sup>(9)</sup>									
<b>Epatite A</b>							Ciclo vaccinale a partire da 1 anno di età nei soggetti a rischio <sup>(10)</sup>				
<b>Influenza</b>					Annuale <sup>(11)</sup>					A rischio <sup>(11)</sup>	

### Interpretazioni delle età di offerta del calendario

**3° mese** si intende dal 61° giorno di vita

**6° anno** si intende da 5 anni e un giorno fino al 6° compleanno

**12° anno** si intende da 11 anni e 1 giorno fino al 12° compleanno

**15° anno** si intende da 14 anni e 1 giorno fino al 15° compleanno

### Legenda:

DTPa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare

dTpa: vaccino antidiftto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti

IPV: vaccino antipolio inattivato

Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b

PCV-15: vaccino antipneumococcico coniugato 15 valente  
Men B: vaccino antimeningococcico B  
MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella  
MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia  
Var: vaccino antivaricella  
Men ACWY: vaccino antimeningococco tetravalente coniugato  
HPV: vaccino antipapilloma virus  
Rotavirus: vaccino contro i rotavirus  
Epatite A: vaccino contro il virus dell'epatite A  
Influenza: vaccino contro i virus influenzali

**Note:**

- 1) Come dose di richiamo al 6° anno può essere utilizzato sia il vaccino combinato quadrivalente formulazione bambini (DTPa-IPV) sia il vaccino quadrivalente a ridotto contenuto di antigeni della difterite e pertosse (dTpa-IPV) il cui impiego è approvato in scheda tecnica a partire dai 4 anni di età. Dopo il compimento dei 7 anni viene utilizzato di norma un vaccino a ridotto contenuto di antigeni della difterite e pertosse (dTpa-IPV).
- 2) Come dose di richiamo al 15° anno viene utilizzato il vaccino quadrivalente dTpa-IPV. I successivi richiami verranno eseguiti ogni 10 anni utilizzando il vaccino dTpa.
- 3) Per i bambini nati da madri positive per HBsAg: somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle immunoglobuline specifiche antiepatite B, la prima dose di vaccino anti-HBV; il ciclo andrà completato con una seconda dose a distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita, anche in concomitanza con le altre vaccinazioni.
- 4) La chiamata attiva per la vaccinazione Men B nell'adolescente avverrà a partire dalla coorte del 2009, includendo in prospettiva futura anche l'eventuale dose di richiamo per i soggetti già immunizzati secondo il calendario del nuovo nato
- 5) La vaccinazione morbillo-parotite-rosolia-varicella è eseguita con vaccino tetravalente MPRV; può essere effettuata con vaccino MPR e vaccino varicella monovalente in presenza di specifiche indicazioni previste dalla "Guida alle controindicazioni delle vaccinazioni (Aggiornamento 2018)".
- 6) Una dose di vaccino Men ACWY è offerta sia ai quindicenni mai vaccinati in precedenza sia agli immunizzati nel secondo anno di vita con Men C o Men ACWY.
- 7) La vaccinazione viene eseguita con vaccino HPV nona valente (contro i genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) verso i ceppi oncogeni e i ceppi causa dei condilomi genitali.
- 8) Per incrementare le coperture vaccinali è opportuno il recupero (catch up) dei giovani fino a 30 anni e delle giovani fino a 40 anni che non si sono vaccinati/e in precedenza.
- 9) La vaccinazione viene somministrata per via orale in due o tre dosi a seconda del tipo di vaccino utilizzato. Il ciclo di base può essere iniziato a 6 settimane e deve terminare entro le 24 o 36 settimane a seconda del vaccino utilizzato.
- 10) La vaccinazione è raccomandata ai contatti stretti di casi di malattia e ai bambini e adolescenti appartenenti a gruppi di popolazione a rischio di esposizione al virus dell'epatite A (nomadi, famiglie provenienti da Paesi ad alta endemia per le quali siano prevedibili viaggi verso i Paesi d'origine)
- 11) Vaccinazione proposta annualmente secondo la Circolare Ministeriale ponendo particolare attenzione ai soggetti rientranti nelle categorie di rischio

## Calendario provinciale delle vaccinazioni degli adulti

VACCINO	ETA'			
	18-25 anni	25-59 anni	60-64 anni	← ≥65 anni
<b>Influenza</b> <sup>(1)</sup>	1 dose/anno (categorie a rischio)		1 dose/anno	
<b>Pneumococco (PCV-20)</b>				1 dose
<b>Pneumococco</b> <sup>(2)</sup> (PCV-20 + PPV23)	1 dose (categorie a rischio)			
<b>Herpes Zoster</b> <sup>(3)</sup>	2 dosi (0,2-6 mesi) categorie a rischio			2 dosi (0,2-6 mesi)
<b>dTpa</b> <sup>(4)</sup>	1 dose booster ogni 10 anni			
<b>EpA</b> <sup>(5)</sup> (Epatite A)	2 dosi (0,6-12 mesi)			
<b>EpB</b> <sup>(6)</sup> (Epatite B)	3 dosi (0,1,6 mesi)			
<b>MPRV</b> <sup>(7)</sup>	2 dosi (0,4-8 settimane)			
<b>MPR</b> <sup>(8)</sup>	2 dosi (0,4-8 settimane)			
<b>VAR</b> <sup>(9)</sup> (Varicella)	2 dosi (0,4-8 settimane)			
<b>MenACWY</b> <sup>(10)</sup> (Meningococco ACWY)	1 dose	1 dose (categorie a rischio)		
<b>MenB</b> <sup>(11)</sup> (Meningococco B)	2 dosi (0,2 mesi)	2 dosi (0,2 mesi) categorie a rischio		
<b>TBE</b> <sup>(12)</sup> (Meningo-encefalite da zecche)	3 dosi (0,1-12 mesi)			
<b>HPV</b> <sup>(13)</sup>	3 dosi (0,2,6 mesi)			

### Legenda:

Influenza: vaccino contro l'influenza stagionale

PCV-20: vaccino antipneumococcico coniugato 20 valente

PPV23: vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23valente

Herpes zoster: vaccino antiherpes Z

dt/dTpa: vaccino antidiftto-tetanico per adulti/antidiftto-tetanico-pertossoico acellulare per adulti

Epatite A: vaccino contro il virus dell'epatite A

Epatite B: vaccino contro il virus dell'epatite B

MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella

VAR: vaccino antivariella

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia

Men ACWY: vaccino antimeningococco tetravalente coniugato

Men B: vaccino antimeningococcico B

TBE: vaccino antimeningoencefalite da zecche

HPV: vaccino antipapilloma virus

**Note:**

- 1) Raccomandata alle categorie di soggetti individuati dalla Giunta Provinciale.
- 2) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva.
- 3) Raccomandata per soggetti con diabete mellito complicato, patologia cardiovascolare (classe NYHA > 3), BPCO e asma severo (FEV1 60%-80%), recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, in particolare se è già stata tentata l'immunizzazione con vaccino vivo attenuato, immunodeficienza congenita/acquisita compresi i soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Tra i soggetti immunodepressi rientrano le seguenti condizioni: immunodeficienza primaria per difetti dell'immunità innata (deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine), per difetti dell'immunità adattativa (deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig quali agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA ecc.) e per deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T tra cui immunodeficienza severa combinata; sindrome di DiGeorge ecc.; immunodeficienza secondaria per tumori in trattamento chemio o radio terapeutico, per trapianto di cellule staminali o di organo solido, per malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), per malattie immunoreumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti, connettiviti sistemiche, malattie auto infiammatorie ecc.), neurologiche, nefrologiche, ematologiche (anemia emolitica autoimmune ecc.), per infezione da HIV e pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20 mg/die prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali esclusi i pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica, e altri immunosoppressori.
- 4) Raccomandata agli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria (3 dosi a 0, 1, 6 mesi), un richiamo di vaccino dTpa ogni 10 anni.
- 5) Offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche, comportamentali o occupazionali
- 6) Offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche, comportamentali o occupazionali
- 7) Nei soggetti non precedentemente vaccinati
- 8) Nei soggetti non precedentemente vaccinati
- 9) Nei soggetti a rischio di complicanze, anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati
- 8) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva
- 9) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva
- 10) Raccomandata per i soggetti residenti in aree a rischio e professionalmente esposti
- 11) Vaccino nonavalente (contro i genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) verso i ceppi oncogeni e i ceppi causa dei condilomi genitali offerto ai maschi fino a 30 anni e alle femmine fino a 40 anni non vaccinati in precedenza e alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche o comportamentali.

## MODALITA' DI OFFERTA VACCINALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

Le vaccinazioni inserite nel calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza sono offerte attivamente e a titolo gratuito dai servizi vaccinali dell'Azienda provinciale ai soggetti iscritti al servizio sanitario provinciale secondo la tempistica prevista nel calendario. Le stesse vaccinazioni sono offerte gratuitamente anche ai bambini e adolescenti presenti nel territorio provinciale anche se non iscritti al servizio sanitario provinciale secondo la tempistica prevista nel calendario.

Per chi non si vaccina al momento della chiamata viene mantenuto il diritto alla gratuità in caso di adesione ritardata sia per le vaccinazioni non obbligatorie pediatriche e dell'adolescenza almeno fino ai 18 anni compresi, sia per quelle dell'adulto nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto-RCP" di ogni specifico vaccino.

Le vaccinazioni effettuate ai viaggiatori che si recano all'estero per missioni umanitarie, missioni di pace, volontariato e motivi di adozione sono gratuite se attestate al momento della vaccinazione.

Nel caso di richieste di vaccinazioni in fasce d'età diverse da quelle previste dal calendario si adottano le modalità indicate di seguito.

- IPV, DTPa/dTpa, dTpaIPV, MPRV, MPR e VAR: l'immunizzazione primaria ed eventuali richiami, sono sempre effettuati gratuitamente dai Servizi vaccinali, anche dopo il compimento del 18° anno d'età.

- Epatite B: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni e per i soggetti a rischio mai vaccinati.

- Hib: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da emofilo.

- Pneumococco. PCV: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni.

- PCV-20 offerta gratuita per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni e per le persone ospiti di Residenze sanitarie assistenziali, socio-assistenziali e altre strutture protette. Nei soggetti a rischio di malattia invasiva da pneumococco a partire dai 18 anni la vaccinazione con PCV-20 è offerta gratuitamente ed è seguita, a distanza di almeno 8 settimane, dalla vaccinazione con PPSV23. La gratuità permane anche per tale vaccino.

- Herpes zoster: offerta gratuita per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni e per le persone ospiti di Residenze sanitarie assistenziali, socio-assistenziali e altre strutture protette. Inoltre, offerta gratuita per i soggetti di età superiore ai 18 con le seguenti condizioni di rischio: diabete mellito complicato, patologia cardiovascolare (classe NYHA > 3), BPCO e asma severo (FEV1 60%-80%), recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, in particolare se è già stata tentata l'immunizzazione con vaccino vivo attenuato, immunodeficienza congenita/acquisita compresi i soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Tra i soggetti immunodepressi rientrano le seguenti condizioni: immunodeficienza primaria per difetti dell'immunità innata (deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine), per difetti dell'immunità adattativa (deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig quali agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA ecc.) e per deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T tra cui immunodeficienza severa combinata; sindrome di DiGeorge ecc.; immunodeficienza secondaria per tumori in trattamento chemio o radio terapeutico, per trapianto di cellule staminali o di organo solido, per malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), per malattie immuno-reumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti, connettiviti sistemiche, malattie auto infiammatorie ecc.), neurologiche, nefrologiche, ematologiche (anemia emolitica autoimmune ecc.), per infezione da HIV e pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20 mg/die prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali esclusi i pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica, e altri immunosoppressori.

- Men B: offerta gratuita per i soggetti fino a 25 anni mai vaccinati in precedenza sia per quelli già immunizzati nell'infanzia purchè siano trascorsi almeno 5 anni dalla dose precedente; dopo il compimento del 25° anno d'età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da meningococco.

- MenACWY: offerta gratuita per i soggetti fino a 25 anni mai vaccinati in precedenza e per quelli già immunizzati nell'infanzia; dopo il compimento del 25° anno d'età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da meningococco.

- HPV (virus del papilloma umano): offerta gratuita alla popolazione femminile di età compresa tra 16 e 40 anni e maschile di età compresa tra 16 e 30 anni non precedentemente vaccinati; dopo tali età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica.

Offerta gratuita per le persone affette da HIV; per altri soggetti a rischio elevato di infezione (uomini che fanno sesso con uomini e soggetti con numerosi partner sessuali); per le donne che hanno subito trattamenti per lesioni HPV correlate fino ad un massimo di 3 anni dal trattamento stesso.

- Epatite A: offerta gratuita alle persone che hanno avuto contatti stretti con un caso di epatite A; ai soggetti della fascia d'età 1-18 anni appartenenti a gruppi di popolazione a rischio di esposizione al virus dell'epatite A (nomadi, famiglie provenienti da Paesi ad alta endemia per le quali siano prevedibili viaggi verso i Paesi di origine), agli emofiliaci, ai detenuti, agli epatopatici cronici e ai tossicodipendenti che fanno uso di droghe iniettabili; ad altri soggetti a rischio elevato di infezione che si rivolgono all'ambulatorio IST (omosessuali e soggetti con numerosi partner sessuali).

-TBE: l'offerta gratuita del vaccino contro l'encefalite da zecche a tutti gli iscritti al Servizio sanitario provinciale.