Calendario provinciale delle vaccinazioni degli adulti

Vaccino	18-49 anni	50 -64 anni	> 64 anni
Influenza (1)	1 dose/anno (categorie a rischio)		1 dose/anno
Pneumococco (2) **(PCV-20)**			1 dose
Pneumococco (3) **(PCV-20+PPSV23)**	1 dose (categorie a rischio)		
Herpes Zoster (4)	2 dosi (0,2-6 mesi) categorie a rischio		2 dosi (0,2-6 mesi)
dT/dTpa (5)	1 dose booster ogni 10 anni		
EpA (Epatite A) (6)	2 dosi (0, 6-12 mesi)		
EpB (Epatite B) (7)	3 dosi (0, 1, 6 mesi)		
MPRV	2 dosi (0,4-8 settimane)		
VAR (varicella) (8)	2 dosi (0,4-8 settimane)		
MPR (9)	2 dosi (0,4-8 settimane)		
Men ACWY (10) (Meningococco ACWY**)**	1 dose		
Men B (11) (Meningococco B)	2 dosi (0,2 mesi)		
TBE (12) (Meningoencefalite da zecche)	3 dosi (0, 2, 12mesi)		
HPV (13)	3 dosi (0, 2, 6 mesi) fino a età massima prevista in scheda tecnica (12)		

Legenda:
Influenza: vaccino contro l'influenza stagionale
PCV-20: vaccino antipneumococcico coniugato 20 valente
PPV23: vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23valente
Herpes zoster: vaccino antiherpes Zoster
dt/dTpa: vaccino antidifto-tetanico per adulti/antidifto-tetanico-pertossico acellulare per adulti
Epatite A: vaccino contro il virus dell'epatite A
Epatite B: vaccino contro il virus dell'epatite B
MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella
VAR: vaccino antivaricella
MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
Men ACWY: vaccino antimeningococco tetravalente coniugato
Men B: vaccino antimeningococcico B
TBE: vaccino antimeningoencefalite da zecche
HPV: vaccino antipapilloma virus

NOTE

1) Raccomandata alle categorie di soggetti individuati dalla Giunta Provinciale.

2) Raccomandata per i soggetti di età > 65 anni.

3) Raccomandata per i soggetti a partire dai 18 anni a rischio di malattia invasiva, per gli ospiti di RSA. 4) Raccomandata per soggetti con diabete mellito complicato, con patologia cardiovascolare (classe NYHA ≥ 3), con BPCOe asma severo (FEV1 60%-80%), con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, in particolare se è già stata tentata l'immunizzazione con vaccino vivo attenuato, per soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva tra cui rientrano i soggetti immunodepressi per immunodeficienza primaria (difetti dell'immunità innata: deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine), i soggetti immunodepressi per difetti dell'immunità adattativa (deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig quali agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA ecc.) e i soggetti immunodepressi per deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T tra cui immunodeficienza severa combinata; sindrome di DiGeorge ecc.; per soggetti con immunodeficienza secondaria per tumori in trattamento chemio o radio terapico, trapianto di cellule staminali o di organo solido, malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), malattie immuno-reumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti, connettiviti sistemiche, malattie auto infiammatorie ecc.), neurologiche, nefrologiche, ematologiche (anemia emolitica autoimmune ecc.), infezione da HIV e pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20 mg/ die prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali esclusi i pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica, e altri immunosoppressori.

5) Raccomandata agli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria (3 dosi a 0, 1, 6 mesi), un richiamo di vaccino dT o dTpa ogni 10 anni.

6) Offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche, comportamentali o occupazionali

7) Offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche, comportamentali o occupazionali

8) Nei soggetti a rischio di complicanze, anamnesticamente negativi e non precedentemente vaccinati

9) Nei soggetti non precedentemente vaccinati

10) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva

11) Raccomandata per i soggetti a rischio di malattia invasiva

12) Raccomandata per i soggetti residenti in aree a rischio e professionalmente esposti

13) Vaccino nonavalente (contro i genotipi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) verso i ceppi oncogeni e i ceppi causa dei condilomi genitali offerto alla popolazione adulta secondo le indicazioni cliniche o comportamentali.

MODALITÀ DI OFFERTA VACCINALE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

Le vaccinazioni inserite nel calendario provinciale delle vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza sono offerte attivamente e a titolo gratuito dai servizi vaccinali dell'Azienda provinciale ai soggetti iscritti al servizio sanitario provinciale secondo la tempistica prevista nel calendario. Le stesse vaccinazioni sono offerte gratuitamente anche ai bambini e adolescenti presenti nel territorio provinciale anche se non iscritti al servizio sanitario provinciale secondo la tempistica prevista nel calendario. Per chi non si vaccina al momento della chiamata viene mantenuto il diritto alla gratuità in caso di adesione ritardata sia per le vaccinazioni non obbligatorie pediatriche e dell'adolescenza almeno fino ai 18 anni compresi, sia per quelle dell'adulto nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Riassunto delle Caratteristiche del ProdottoRCP" di ogni specifico vaccino.

Le vaccinazioni effettuate ai viaggiatori che si recano all'estero per missioni umanitarie, missioni di pace, volontariato e motivi di adozione sono gratuite.

Nel caso di richieste di vaccinazioni in fasce d'età diverse da quelle previste dal calendario si adottano le modalità indicate di seguito.

- IPV, DTPa/dTpa, dTpaIPV, MPR e VAR: l'immunizzazione primaria ed eventuali richiami, sono sempre effettuatigratuitamente dai Servizi vaccinali, anche dopo il compimento del 18° anno d'età.

-Epatite B: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni e per i soggetti a rischio mai vaccinati.

- Hib: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasivada emofilo.

- Pneumococco. PCV: offerta gratuita per i soggetti 0-18 anni.

PCV-20: offerta gratuita per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni e per le persone ospiti di Residenze sanitarie assistenziali, socio-assistenziali e altre strutture protette. Nei soggetti a rischio di malattia invasiva da pneumococco a partire dai 18 anni la vaccinazione con PCV-20 è offerta gratuitamente ed è seguita, a distanza di almeno 8 settimane, dalla vaccinazione con PPSV23. La gratuità permane anche per tale vaccino.

- Herpes zoster: offerta gratuita per le persone di età uguale o superiore ai 65 anni e per le persone ospiti di Residenze sanitarie assistenziali, socio-assistenziali e altre strutture protette. Inoltre, offerta gratuita per i soggetti di età superiore ai 18 con le seguenti condizioni di rischio: diabete mellito complicato, patologia cardiovascolare (classe NYHA$\geq$ 3), BPCO e asma severo (FEV1 60%-80%), recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster, in particolare se è già stata tentata l'immunizzazione con vaccino vivo attenuato, immunodeficienza congenita/acquisita compresi i soggetti destinati a terapia immunosoppressiva. Tra i soggetti immunodepressi rientrano le seguenti condizioni: immunodeficienza primaria per difetti dell'immunità innata (deficit del complemento, difetti delle cellule fagocitiche, difetti associati ai recettori cellulari e alla produzione di citochine), per difetti dell'immunità adattativa (deficit della produzione delle Ig o di sottoclassi di Ig quali agammaglobulinemia, immunodeficienza comune variabile, deficit di IgA ecc.) e per deficit combinati che coinvolgono la funzione delle cellule T tra cui immunodeficienza severa combinata; sindrome di DiGeorge ecc.; immunodeficienza secondaria per tumori in trattamento chemio o radio terapico, per trapianto di cellule staminali o di organo solido, per malattie infiammatorie croniche tra cui le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI/IBD), per malattie immuno-reumatologiche (malattie infiammatorie articolari, LES, vasculiti, connettiviti sistemiche, malattie auto infiammatorie ecc.), neurologiche, nefrologiche, ematologiche (anemia emolitica autoimmune ecc.), per infezione da HIV e pazienti in trattamento con corticosteroidi ad alte dosi (20 mg/die prednisone), farmaci citotossici, inibitori della calcineurina, anticorpi monoclonali esclusi i pazienti in terapia con anticorpi monoclonali per sola osteoporosi o per la sola dermatite atopica, e altri immunosoppressori.

- Men B: offerta gratuita per i soggetti fino a 25 anni; dopo il compimento del 25° anno d'età la vaccinazione viene eseguitaa pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da meningococco. Inoltre, qualora la situazione epidemiologica provinciale lo richiedesse, l'offerta per età può essere integrata.

- MenACWY: offerta gratuita per i soggetti nel secondo anno di vita e a partire dal compimento del 12° anno di vita fino ai25 anni sia per gli adolescenti mai vaccinati in precedenza sia per quelli già immunizzati

nell'infanzia; dopo il compimento del 25° anno d'età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per i soggetti di tutte le età ad alto rischio di malattia invasiva da meningococco.

- HPV (virus del papilloma umano): offerta gratuita alla popolazione femminile di età compresa tra 16 e 40 anni e maschiledi età compresa tra 16 e 30 anni; dopo tale età la vaccinazione viene eseguita a pagamento su richiesta dell'interessato fino all'età massima prevista in scheda tecnica. Offerta gratuita per le persone affette da HIV; per altri soggetti a rischio elevato di infezione che si rivolgono all'ambulatorio IST (omosessuali e soggetti con numerosi partner sessuali); per le donne che hanno subito trattamenti per lesioni HPV correlate fino ad un massimo di 3 anni dal trattamento stesso.

- Epatite A: offerta gratuita alle persone che hanno avuto contatti stretti con un caso di epatite A; ai soggetti della fascia d'età 1-18 anni appartenenti a gruppi di popolazione a rischio di esposizione al virus dell'epatite A (nomadi, famiglie provenienti da Paesi ad alta endemia per le quali siano prevedibili viaggi verso i Paesi di origine), agli emofiliaci, ai detenuti, agli epatopatici cronici e ai tossicodipendenti che fanno uso di droghe iniettabili; ad altri soggetti a rischio elevato di infezione che si rivolgono all'ambulatorio IST (omosessuali e soggetti con numerosi partner sessuali).

-TBE**:** l'offerta gratuita del vaccino contro l'encefalite da zecche a tutti gli iscritti al Servizio sanitario provinciale.